








Preparat

Preparat			Obero- ende av måltid			Antacida	Fe, Ca, Mg	Måste sväljas hela
Amimox, Imacillin (amoxicillin)			×					(×)
Avelox (moxifloxacin)			×		×	×	×	(×)
Azitromax (azitromycin)			×					×
Bactrim, Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol)	×							
Bioclavid, Spektramox (amoxicillin + klavulansyra)	×							
Cefamox (cefadroxil)	×							(×)
Ciproxin (ciprofloxacin)		×			×	×	×	(×)
Dalacin (klindamycin)			×					×
Doxyferm, Vibramycin, Oracea (doxycyklin)	×				×	×	×	(×)
Ery-Max, Abboticin (erytromycin)	×							(×)
Flagyl (metronidazol)			×	×				(×)
Fucidin (fusidinsyra)		×						
Furadantin (nitrofurantoin)	×							
Heracillin (flukloxacillin)		×						(×)
Hiprex (metenamin)			×			×		


 = Tas med måltid

 = 1 tim före eller 2 tim efter måltid

 = Alkohol ska undvikas






 = Risk för fotosensibilisering

 = Antacida = Antacida bör undvikas

 = Fe, Ca, Mg = Järn, kalcium, magnesium bör undvikas under behandlingstiden. Mejeriprodukter undviks i direkt anslutning till antibiotikaintag.

(X) = Preparat bör sväljas hela

Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.

Preparat			Obero- ende av måltid			 Antacida	 Fe, Ca, Mg	Måste sväljas hela
Idotrim (trimetoprim)			×					
Klacid (klaritromycin)			×					
Kåvepenin, Tikacillin (PcV)	barn ×	vuxna ×						
Norfloxacin (norfloxacin)		×			×	×	×	(x)
Rimactan, Rifadin (rifampicin)		×				×		×
Rimactazid (rifampicin + isoniazid)		×		×		×		(x)
Rimstar (rifampicin + pyrazina- mid + isoniazid + etambutol)		×		×		×	×	(x)
Selexid, Penomax (pivmecillinam)			×					
Surlid (roxitromycin)		×						
Tavanic (levofloxacin)			×		×	×	×	(x)
Tetracyklin (tetracyklin)		×			×	×	×	×
Tetralysal (lymecyklin)	×				×	×	×	×
Tibinide (isoniazid)		×		×				×
Vancocin (vankomycin)			×					×
Zyvoxid (linezolid)			×	×				(x)



= Tas med måltid



= 1 tim före eller 2 tim efter måltid




= Alkohol ska undvikas



= Risk för fotosensibilisering

 **Antacida** = Antacida bör undvikas

 **Fe, Ca, Mg** = Järn, kalcium, magnesium bör undvikas under behandlingstiden. Mejeriprodukter undviks i direkt anslutning till antibiotikaintag.

(X) = Preparat bör sväljas hela

Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.

strama Gävleborg

Samverkan mot antibiotikaresistens

Utarbetat av Stramagruppen Uppsala län.