

# Stramas

## Punktprevalensstudier - PPS

### 2003-2010

Gunilla Skoog, Mats Erntell  
Strama Dagen  
2011-05-25


# Stramas PPS 2003-2010

	2003	2004	2006	2008	2010
Antal inneliggande	13536	11348	17136	16318	17648
Antal/(andel) behandlade	4178 (30,9%)	3622 (31,9%)	5588 (32,6%)	5339 (32,7%)	5928 (33,6%)
Terapier	4396	3841	5933	5686	6360
Preparat	5123	4442	6924	6600	7286
DDD	5085	4612	7040	7072	7597
DDD/100 inneliggande vuxna	40,3	43,1	43,6	45,9	45,7
Samhällsförvärv	17,0%	18,0%	17,9%	17,9%	18,7%
Vårdrelaterade	9,2%	9,4%	10,4%	10,4%	10,6%
Profylax	6,3%	6,4%	6,4%	6,5%	6,7%

# Fördelning av diagnosgrupp vid behandling av vuxna


Terapier per 100 inneliggande inom vuxenspecialiteter

Stramas PPS 2003-2010




# Fördelning av antibiotika vid behandling av vuxna

Stramas PPS 2003-2010



# Fördelning cefalosporiner vid behandling av vuxna


Stramas PPS 2003-2010



# Fördelning av antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna

Antimykotika och tuberkulosläkemedel exkluderade


Stramas PPS 2003-2010



# Piperacillin med tazobactam och cefalosporiner vid tre olika diagnosgrupper


Lga-lever/gallvägar/pankreas, GiÖ-övre gastrointestinalkanalen, GiN-nedre gastrointestinalkanalen

Stramas PPS 2003-2010



# Fördelning av antibiotika vid samhällsförvärvad cystit hos vuxna kvinnor


Stramas PPS 2003-2010



# Fördelning av diagnosgrupp vid behandling av barn


Terapier per 100 inneliggande inom barnspecialiteter

Stramas PPS 2003-2010




# Fördelning av antibiotika vid behandling av barn

Stramas PPS 2003-2010




# Fördelning av antibiotika vid kirurgisk profylax till vuxna

Stramas PPS 2003-2010




# Längd av antibiotikaprofylax vid nedre gastrointestinal kirurgi, alla åldrar

Stramas PPS 2003-2010




# Administrationssätt vid behandling, oralt eller parenteralt

Stramas PPS 2003-2010, alla åldrar




## Relevant odling före terapi Stramas PPS 2003-2010





# Fördelning cefalosporiner vid behandling av vuxna


Stramas PPS 2003-2010



Kommentar: Ett skifte från cefuroxim till cefotaxim har skett inom cefalosporingruppen.


# Piperacillin med tazobactam och cefalosporiner vid tre olika diagnosgrupper

Lga-lever/gallvägar/pankreas, GiÖ-övre gastrointestinalkanalen, GiN-nedre gastrointestinalkanalen  
Stramas PPS 2003-2010



# Längd av given antibiotikaprofylax inom kirurgiska specialiteter, alla åldrar


Stramas PPS 2003-2010



Kommentar: Bilden inkluderar alla opererande kirurgiska specialiteter, invärtesmedicinska specialiteter är exkluderade.

# Andel parenteral behandling vid samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion

Stramas PPS 2003-2010, alla åldrar



Kommentar: Data omfattar val av **parenteral** beredning vid behandling av samhällsförvärvad **respektive** vårdrelaterad infektion.