



Samverkan mot antibiotikaresistens

Ersättning för erytromycin (Abboticin®) tablett 250 mg

2023-08-06

Abboticin® (erytromycin) tabletter 250 mg kommer att vara restnoterade på den svenska marknaden under hösten 2023 (fram till och med november). Erytromycin i form av Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml, eller dospåse 200 mg, kommer under tiden att finnas tillgängligt.

Som ersättning till erytromycin (Abboticin®) tabletter 250 mg rekommenderar Nationella Strama i första hand Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml. Normaldosering till vuxna av den oral suspensionen 100 mg/ml är 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dagar.

Specifika rekommendationer

Erytromycin (Abboticin®) tabletter rekommenderas specifikt av Nationella Strama vid akut mediaotit hos vuxna och barn > 35 kg vid penicillinallergi av typ 1 samt vid akut pneumoni till barn > 35 kg vid penicillinallergi av typ 1. Följande rekommendationer ges för nu för Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml:

Akut mediaotit hos vuxna

Vid penicillinallergi av typ 1 hos vuxna kan tablett erytromycin (Abboticin®) 500 mg x 4 i 7 dagar ersättas med Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml i dosering 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dagar.

Akut mediaotit hos barn

Vid penicillinallergi av typ 1 hos barn > 35 kg kan tablett erytromycin (Abboticin®) 500 mg x 4 i 7 dagar ersättas med Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml i dosering 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dagar

Akut pneumoni hos barn

Vid penicillinallergi av typ 1 hos barn > 35 kg kan tablett erytromycin (Abboticin®) 500 mg x 4 i 7 dagar ersättas med Ery-Max® granulat till oral suspension 100 mg/ml i dosering 500 mg (5 ml) x 4, alternativt 1 g (10 ml) x 2, i 7 dagar.