

Förslag vid brist på amoxicillin

Just nu är det brist på flera förpackningar med amoxicillin tabletter och oral suspension. Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera. Om amoxicillin inte finns tillgängligt – se nedanstående förslag på lämpliga alternativ vid olika indikationer samt licensalternativ.

Läkemedelsverket har också beslutat om särskilda tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande amoxicillin i [tablettform](#) och som [oral suspension](#). För expedition krävs dock att vårdenheten har en generell licens beviljad för läkemedlet. Besluten gäller till och med den 31 januari respektive 31 maj 2024.

Tillgången till oral suspension är mycket begränsad och ska reserveras till barn.

Rekommendationer för amoxicillin och alternativ:

Antibiotikaproylax inom tandvården

Om antibiotikaproylax är indicerat till en patient inför ett invasivt tandingrepp gäller nedanstående engångsdos en timme innan ingrepp.

Till vuxna:

- I första hand:
amoxicillin 2 g (500 mg x 4 eller 1 g x 2)
- I andra hand:
amoxicillin 2,25 g (750 mg x 3)
- I tredje hand samt vid penicillinallergi:
klindamycin 600 mg

Till barn:

- I första hand:
amoxicillin 50 mg/kg kroppsvikt
- I andra hand samt vid penicillinallergi:
klindamycin 15 mg/kg kroppsvikt

Terapivikt vid akut otitis media:

Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlings svar.

- I första hand:
amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
- I andra hand:
– till barn trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 7 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)
– till vuxna trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 7 dygn

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor:

- till barn fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3) alternativt amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
- till vuxna fenoximetylpenicillin (PcV) 1,6–2 g x 3 i 10 dygn alternativt amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dygn

Pneumoni hos vuxna - underliggande KOL:

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

- I första hand:
amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn
- I andra hand:
doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn alternativt
trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn

Pneumoni hos barn:

 amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 750 mg x 3) alternativt
 fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)

Exacerbation av KOL:

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

- I första hand:
amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn alternativt
doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
- I andra hand:
trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn

För förslag på licensalternativ – kontakta apotek alternativt se nedanstående nationella förslag för amoxicillin oral suspension (se även respektive produktresumé, SPC, för mer info)

Licensalternativ till Amoxicillin, oral suspension						
JAMP-Amoxicillin powder for oral suspension	250mg/5ml, 100ml	Jamp Pharma Corporation	Canada/02535 815	899 kr	5-10 days	1st
Amoxicillin Sandoz® granules for oral suspension	200mg/4ml, 100ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	Switzerland/49 923 (Swissmedic)	799 kr	3-7 days	1st
Amoxicillin powder for oral suspension	250mg/5ml, 100ml	Aurobindo Pharma Limited	United States/NDC 65862-707-01	899 kr	5-10 days	1st
Amoxicillin powder for oral suspension	400mg/5ml, 100ml	Aurobindo Pharma Limited	United States/NDC 65862-071-01	795 kr	5-10 days	1st
Amoxicilline Sandoz Forte powder for oral suspension	250mg/5ml, 100ml	Sandoz B.V.	Netherlands/R VG 29703	535 kr	3-7 days	1st