





Preparat			Oberoende av måltid			Antacida	Fe, Ca, Mg	Delbarhet	Intas stående eller sittande
Amoxicillin			✓					(X)	
Amoxicillin + klavulansyra	✓							D	
Atovakvon	✓							-	
Azitromycin			✓			✓		FASS	
Cefadroxil	✓							FASS	
Ceftibuten (licens)		✓						(X)	
Ciprofloxacilin			✓		✓	✓	✓	(X)	
Doxycyklin	✓			✓	✓	✓	✓	D	S
Doxycyklin (Oracea)		✓		✓	✓	✓	✓	X	S
Erytromycin	✓							(X)	
Etambutol			✓				✓		
Fenoximetylpenicillin	Barn	Vuxna						D	
Flukloxacillin		✓						1/2 Ej 125 mg	
Flukonazol			✓					(X)	
Fusidinsyra		✓		✓				X	
Itrakonazol								X	
Isoniazid (Tibinide)	Efter måltid	✓		✓		✓	✓	D	
Klaritromycin			✓					X	



Tas med måltid



1 tim före eller 2 tim efter måltid



Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

**X** Antacida ska undvikas under behandlingstiden.

**X** Fe, Ca, Mg ska undvikas under behandlingstiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

#### Delbarhet och övrig information

Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.

1/2 kan delas i två lika stora doser.





D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas i liggande ställning.

Preparat			Obero- ende av måltid			Anta- cida	Fe, Ca, Mg	Delbar- het	Intas stående eller sittande
Kindamycin			✓					X	S
Levofloxacin			✓		✓	✓	✓	1/2	
Linezolid			✓	✓				FASS	
Lymecyklin	✓				✓	✓	✓	X	S
Metenamin			✓			✓		D	
Metronidazol			✓	✓				(X)	
Moxifloxacin			✓		✓	✓	✓	X	
Nitrofurantoin	✓							D	
Nystatin		✓							
Pivmecillinam			✓					(X)	
Posakonazol			✓					X	
Rifampicin		✓		✓		✓		X	
Rifaximin			✓					X	
Sulfametoxazol + trimetoprim	✓							D	
Tetracyklin		✓			✓	✓	✓	X	S
Trimetoprim			✓					D	
Vankomycin			✓					X	
Vorikonazol		✓			✓			X	



Tas med måltid



1 tim före eller 2 tim efter måltid



Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

**X** Antacida ska undvikas under behandlingstiden.

**X** Fe, Ca, Mg ska undvikas under behandlingstiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

### Delbarhet och övrig information

*Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.*

1/2 kan delas i två lika stora doser.

D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas i liggande ställning.