

Titel – Slv Infektion 3g: Andel patienter med behandlingstid >7 dygn vid febril UVI

Fullständigt namn – Andel patienter med antibiotikabehandlad febril UVI med >7 dygns behandlingstid senaste 12 månaderna

Om indikatorn – Den rekommenderade behandlingstiden vid febril UVI har blivit kortare genom åren och i de flesta fall bedöms nu 7 dygns behandling från första effektiva dos vara tillräcklig för både kvinnor och män. Observera att det för män med febril UVI och immunsuppression eller samtidig misstänkt akut bakteriell prostatit med prostatasmärta rekommenderas 10–14 dygns behandling. Indikatorn mäter i vilken omfattning man tagit till sig de nya rekommendationerna om kortare behandlingstid.

Indikatorn ingår i NAG Stramas Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika
Ursprung: Arbetsgrupp med representanter från regionala Stramagrupper

Att tänka på vid tolkning – Om ordinationsorsak eller administreringstider inte registreras vid ordinationen kan inte tillförlitliga data tas fram. Tillgången till data bygger på journaldata. Hur data tagits fram behöver vägas in vid tolkning.

Datakälla - Journaldata i respektive region omfattande behandlingstid, LOT eller journalgranskning

Typ av mått – Andel

Täljare – Antal ordinationsorsaker med antibiotikabehandlade febrila UVI:er som behandlats i >7 dygn.

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Kvinnor och män

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk) exklusive J01XX05 (metenamin)

Ordningsorsak: Febril UVI (urinvägsinfektion med feber alternativt pyelonefrit)

Behandlingstid: 7 påbörjade 24-timmarsperioder med antibiotikabehandling

Nämnare – Antal ordinationsorsaker med antibiotikabehandlade febrila UVI:er

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Kvinnor och män

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk) exklusive J01XX05 (metenamin)

Ordningsorsak: Febril UVI (urinvägsinfektion med feber alternativt pyelonefrit)

Behandlingstid: Alla behandlingstider

Tröskelvärde för visning – Gräns för hur många fall i nämnaren som får visas: 5

Projektspecifik information – Sekvens för datauttag: Antal ordinationsorsak febril UVI (urinvägsinfektion med feber alternativt pyelonefrit) där antibiotika administrerats under ett antal

påbörjade 24-timmarsperioder för respektive patient: J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk) exklusive J01XX05 (metenamin). Antal febrila UVI:er med >7 påbörjade 24-timmarsepisoder med antibiotika divideras med alla antibiotikabehandlade febrila UVI:er. Journaldata med uppgifter om behandlingstider eller administreringstider krävs.

Giltighetstid fr.o.m. – 2026-07-01

Utgivare – NAG Strama

Rapporteringsperioder – År

Enhetstyper – *Vårdenhet*. (Sjukhusnivå, men om möjligt också klinik/verksamhetsnivå)

Önskvärd riktning – Lågt.

Referenser –

(1) Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36.

(2) Svenska infektionsläkarföreningens Vårdprogram UVI (Urinvägsinfektioner hos vuxna)(2026).
[Vårdprogram UVI, rev 2026.pdf](#)

Regionstillhörighet – Regiontillhörigheten utgår från den region verksamheten finns i.

Registerbeskrivning – Data tas fram av respektive region.

Nyckelord – Strama, slutenvård, urologi, urinvägsinfektion, UVI, febril UVI, pyelonefrit, läkemedelsbehandling, antibiotika, infektionssjukdom