

Titel – Slv Infektion 5a: Andel ordinationsorsak perioperativ profylax

Fullständigt namn – Andel första antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax av alla antibiotikaordinationer som första ordination senaste 12 månaderna

Om indikatorn – För att förstå och analysera verksamhetens användning av antibiotika är det viktigt att följa upp i vilken omfattning antibiotika används som perioperativ profylax och inte som infektionsbehandling. Antibiotika som perioperativ profylax ska bara ges under en kortare tid i samband med operation. Vissa antibiotika har en särskilt stor användning som perioperativ profylax och information om hur stor andel av förstaordinationerna som utgör perioperativ profylax gör det lättare att analysera verksamhetens antibiotikaprofil.

Indikatorn ingår i NAG Stramas Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika
Ursprung: Arbetsgrupp med representanter från regionala Stramagrupper

Att tänka på vid tolkning – Om ordinationsorsak inte registreras vid ordinationen kan inte tillförlitliga data tas fram. Tillgången till data bygger på rapporter ur Infektionsverktyget eller motsvarande. Hur data registrerats behöver vägas in vid tolkning.

Datakälla - Infektionsverktyget eller motsvarande i respektive region

Typ av mått – Andel

Täljare – Antal första antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax

Ordination: Endast första ordination

Nämnare – Antal första antibiotikaordinationer (alla ordinationsorsaker)

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Ordinationsorsak: Alla ordinationsorsaker

Ordination: Endast första ordination

Tröskelvärde för visning – Gräns för hur många fall i nämnaren som får visas: 5

Projektspecifik information – Sekvens för datauttag: Andel ordinationsorsak perioperativ antibiotikaprofylax som första ordination av alla första ordinationer med antibiotika J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Giltighetstid fr.o.m. – 2026-07-01

Utgivare – NAG Strama

Rapporteringsperioder – År

Enhetstyper – *Vårdenhet*. (Sjukhusnivå, men om möjligt också klinik/verksamhetsnivå)

Önskvärd riktning –

Referenser –

Regionstillhörighet – Regiontillhörigheten utgår från den region verksamheten finns i.

Registerbeskrivning – Data tas fram av respektive region.

Nyckelord – Strama, slutenvård, perioperativ profylax, peroperativ profylax, profylax, läkemedelsbehandling, antibiotika