

Titel – Slv Infektion 5b: Perioperativ antibiotikaprofylax uppdelat på substans

Fullständigt namn – Antal antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax uppdelat per substans senaste 12 månaderna

Om indikatorn – För att förstå och analysera verksamhetens användning av antibiotika som perioperativ profylax är det av värde att följa upp vilka antibiotika som används. Antibiotika som perioperativ profylax ska bara ges under en kortare tid i samband med operation. För att ytterligare mäta följsamheten till rekommendationer om antibiotikaprofylax kan man koppla given antibiotikaprofylax till olika typer av kirurgi eller olika KVÅ-koder.

Indikatorn ingår i NAG Stramas Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Ursprung: Arbetsgrupp med representanter från regionala Stramagrupper

Att tänka på vid tolkning – Om ordinationsorsak inte registreras vid ordinationen kan inte tillförlitliga data tas fram. Tillgången till data bygger på rapporter ur Infektionsverktyget eller motsvarande. Hur data registrerats behöver vägas in vid tolkning.

Datakälla - Infektionsverktyget eller motsvarande i respektive region. (För koppling till typ av kirurgi eller KVÅ-kod krävs tillgång till journaldata.)

Typ av mått – Antal

Täljare – Antal antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax uppdelat på substans

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol) uppdelat på 7-ställig ATC-kodsnivå.

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax. (För att ytterligare mäta följsamheten till rekommendationer om antibiotikaprofylax kan man koppla given antibiotikaprofylax till olika typer av kirurgi eller olika KVÅ-koder.)

Nämnare –

Tröskelvärde för visning – Gräns för hur många fall som får visas: 5

Projektspecifik information – Sekvens för datauttag: Antal ordinationsorsak perioperativ antibiotikaprofylax uppdelat på 7-ställig ATC-kodsnivå för J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Giltighetstid fr.o.m. – 2026-07-01

Utgivare – NAG Strama

Rapporteringsperioder – År

Enhetstyper – *Vårdenhet*. (Sjukhusnivå, men om möjligt också klinik/verksamhetsnivå)

Önskvärd riktning –

Referenser –

Regionstillhörighet – Regiontillhörigheten utgår från den region verksamheten finns i.

Registerbeskrivning – Data tas fram av respektive region.

Nyckelord – Strama, slutenvård, perioperativ profylax, peroperativ profylax, profylax, läkemedelsbehandling, antibiotika