

Titel – Slv Infektion URO1: Andel perioperativ antibiotikaprofylax <24 timmar inom urologisk kirurgi

Fullständigt namn – Andel antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax som pågått <24 timmar inom urologisk kirurgi senaste 12 månaderna

Om indikatorn – Antibiotika som profylax inför och under kirurgi ska pågå kortast möjliga tid för att undvika onödig antibiotikabehandling. Helst ska endast en dos ges inför operation, men vid längre operationer kan påfyllnadsdoser behövas. Som regel ska antibiotikaprofylax i samband med kirurgi inte pågå >24 timmar. Att följa upp andelen perioperativ antibiotikaprofylax som pågår <24 timmar hjälper verksamheten att identifiera följsamhet till behandlingsrekommendationer och undvika längre profylax. För att ytterligare mäta följsamheten till rekommendationer om antibiotikaprofylax kan man koppla given antibiotikaprofylax till olika typer av kirurgi eller olika KVÅ-koder.

Indikatorn ingår i NAG Stramas Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Ursprung: Arbetsgrupp med representanter från regionala Stramagrupper i samarbete med Svensk Urologisk Förening.

Att tänka på vid tolkning – Om ordinationsorsak eller administrationstider inte registreras kan inte tillförlitliga data tas fram. Tillgången till data bygger framför allt på journaldata. Hur data registrerats behöver vägas in vid tolkning.

Datakälla – Tillgång till journaldata i respektive region

Typ av mått – Andel

Täljare – Antal antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax <24 timmar inom urologisk kirurgi

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Urologi

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax

Administrationstid: Tiden från första till sista administration av samma antibiotikasubstans ska inte ha överstigit 24 timmar.

Nämnare – Antal antibiotikaordinationer med ordinationsorsak perioperativ profylax inom urologisk kirurgi

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Urologi

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Läkemedel: J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol)

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax

Administrationstid: Alla längder på tiden från första till sista administration av samma antibiotikasubstans

Tröskelvärde för visning – Gräns för hur många fall i nämnaren som får visas: 5

Projektspecifik information – Sekvens för datauttag: Andel ordinationsorsak perioperativ antibiotikaprofylax med J01 (antimikrobiella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) samt P01AB01 (metronidazol) där tiden från första till sista administration av samma antibiotikasubstans inte överstigit 24 timmar. (För att ytterligare mäta följsamheten till rekommendationer om antibiotikaprofylax kan man koppla given antibiotikaprofylax till olika typer av kirurgi eller olika KVÅ-koder.)

Giltighetstid fr.o.m. – 2026-07-01

Utgivare – NAG Strama

Rapporteringsperioder – År

Enhetstyper – *Vårdenhet*. (Sjukhusnivå, men om möjligt också klinik/verksamhetsnivå)

Önskvärd riktning – Hög andel perioperativ antibiotikaprofylax <24 timmar

Referenser –

Regionstillhörighet – Regiontillhörigheten utgår från den region verksamheten finns i.

Registerbeskrivning – Data tas fram av respektive region.

Nyckelord – Strama, slutenvård, perioperativ profylax, peroperativ profylax, profylax, läkemedelsbehandling, antibiotika