

Titel – Slv Infektion URO2: Andel trim-sulfa som perioperativ profylax vid urologisk kirurgi

Fullständigt namn – Andel trim-sulfa som perioperativ antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi senaste 12 månaderna

Om indikatorn – Trim-sulfa är ofta förstahandsval som antibiotikaprofylax i samband med urologisk kirurgi. Mer resistensdrivande alternativ, som till exempel ciprofloxacin, bör om möjligt undvikas. Finns odlingssvar anpassas profylaxen efter det. Andelen ordinationer med trim-sulfa som antibiotikaprofylax i samband med urologisk kirurgi bör vara hög.

Indikatorn ingår i NAG Stramas Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Ursprung: Arbetsgrupp med representanter från regionala Stramagrupper i samarbete med Svensk Urologisk Förening.

Att tänka på vid tolkning – Om ordinationsorsak inte registreras vid ordinationen kan inte tillförlitliga data tas fram. Tillgång till data bygger på rapporter ur Infektionsverktyget eller motsvarande och förutsätter att data för urologisk kirurgi kan separeras från andra kirurgiska ingrepp. Hur data registrerats behöver vägas in vid tolkning.

Datakälla - Infektionsverktyget eller motsvarande i respektive region

Typ av mått – Andel

Täljare – Antal ordinationsorsaker med perioperativ antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi där trim-sulfa givits.

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Verksamhet: Urologisk klinik eller urologisk kirurgi

Läkemedel: J01EE01 (sulfatmetoxazol och timetoprim - "trim-sulfa")

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax

Nämnare – Antal ordinationsorsaker med perioperativ antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi

Tid: Senaste 12 månaderna (rullande)

Ålder: Samtliga

Kön: Samtliga

Verksamhetstyp: Samtliga

Vårdform: Både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset

Verksamhet: Urologisk klinik eller urologisk kirurgi

Läkemedel: J01 (antibakteriella medel för systemiskt bruk) exkl J01XX05 (metenamin) och P01AB01 (metronidazol)

Ordinationsorsak: Perioperativ profylax

Tröskelvärde för visning – Gräns för hur många fall i nämnaren som får visas: 5

Projektspecifik information – Sekvens för datauttag: Antal ordinationsorsak perioperativ antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi eller urologisk klinik där trim-sulfa givits divideras med antalet ordinationsorsaker perioperativ antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi eller urologisk klinik.

Giltighetstid fr.o.m. – 2026-07-01

Utgivare – NAG Strama

Rapporteringsperioder – År

Enhetstyper – *Vårdenhet*. (Sjukhusnivå, men indikatorn avser endast urologisk vård)

Önskvärd riktning – Hög andel trium-sulfa

Referenser –

(1) Nationella Stramas rekommendationer vid urologisk profylax 2023 [Profylax | Strama Nationell](#)

Regionstillhörighet – Regiontillhörigheten utgår från den region verksamheten finns i.

Registerbeskrivning – Data tas fram av respektive region.

Nyckelord – Strama, slutenvård, urologi, urologisk kirurgi, profylax, läkemedelsbehandling, antibiotika, infektionssjukdom